

СОДЕРЖАНИЕ

Том 94, номер 10, 2017

Образование тесных двойных черных дыр, сливающихся за счет излучения гравитационных волн	
<i>А. В. Тутуков, А. М. Черпащук</i>	821
Поиск и обнаружение пульсаров в мониторинговых наблюдениях на частоте 111 МГц	
<i>С. А. Тюльбашев, В. С. Тюльбашев, М. А. Китаева, А. И. Чернышова, В. М. Малофеев, И. В. Чашей, В. И. Шишов, Р. Д. Дагжесаманский, С. В. Клименко, И. П. Никитин, Л. Д. Никитина</i>	837
Изменения орбитальных периодов затменно-двойных систем TU Snc, VZ Leo и OS Ori	
<i>А. И. Халиуллина</i>	849
Активность M4.5 карлика из скопления Гиады с планетной системой	
<i>Е. С. Дмитриенко, И. С. Саванов</i>	862
Флуктуации четности в звездном динамо	
<i>Д. Л. Мосс, Д. Д. Соколов</i>	869
Поиск тесных звездных сближений с Солнечной системой по данным о ближайших карликах	
<i>В. В. Бобылев</i>	875
О морфологических признаках киральности солнечных волокон	
<i>Б. П. Филиппов</i>	883
Гелиосейсмические модели Солнца с низким содержанием тяжелых элементов	
<i>С. В. Аюков, В. А. Батурин</i>	894
